



Problema 2 - dartz

100 puncte

Alex este mare jucător de dartz. Pentru acest joc se folosește o tablă în formă de disc împărțită în regiuni, iar fiecare regiune are asociat un punctaj (număr natural nenul). Jocul de desfășoară în patru etape. La fiecare etapă jucătorul are la dispoziție trei săgeți pe care le aruncă spre tablă. Punctajul obținut de fiecare săgeată este egal cu punctajul regiunii în care a ajuns acesta. Punctajul total S obținut de jucător la finalul jocului este suma punctajelor de la cele patru etape. Neavând partener de joc, Alex se hotărăște să joace singur toate cele patru etape. Totodată, pentru a lucra și la aritmetică, el decide ca punctajul fiecărei etape să fie egal cu produsul punctajelor obținute de cele trei săgeți. De exemplu, dacă la o etapă punctajele obținute de cele trei săgeți sunt: 3, 4, 5, atunci punctajul etapei va fi 60 ($60=3 \cdot 4 \cdot 5$).



Spre surprinderea lui Alex, după aruncarea săgeților, la fiecare etapă punctajele obținute de cele trei săgeți sunt numere naturale nenule consecutive. În plus, suma punctajelor a două etape este egală cu suma punctajelor celorlalte două etape.

Cerință

Să se scrie un program care să citească punctajul total S și să determine pentru fiecare etapă cel mai mic punctaj pe care poate să-l obțină o săgeată.

Date de intrare

Fișierul de intrare `dartz.in` conține o singură linie pe care este scris numărul natural S .

Date de ieșire

Fișierul `dartz.out` va conține o singură linie pe care sunt scrise patru numere naturale nenule a b c d , separate prin câte un spațiu, a reprezentând cel mai mic punctaj pe care poate să-l obțină o săgeată la prima etapă, b reprezentând cel mai mic punctaj pe care poate să-l obțină o săgeată la a doua etapă, c reprezentând cel mai mic punctaj pe care poate să-l obțină o săgeată la a treia etapă, d reprezentând cel mai mic punctaj pe care poate să-l obțină o săgeată la a patra etapă.

Restricții și precizări:

- $1 \leq S \leq 80000000$
- S este număr natural
- Pot exista mai multe soluții. Se cere doar una dintre ele.
- Pentru toate testele utilizate la evaluare există soluție.

Exemplu

dartz.in	dartz.out	Explicație
1560	3 8 3 8	O soluție posibilă poate fi cu punctajele pentru fiecare etapă: etapa 1: 3, 4, 5 etapa 2: 8, 9, 10 etapa 3: 3, 4, 5 etapa 4: 8, 9, 10 La etapele 1 și 3 se obțin punctajele 60, iar la etapele 2 și 4 punctajele 720. Punctajul total este $60+720+60+720=1560$. Se observă că restricția ”suma punctajelor obținute la două etape este egală cu suma punctajelor de la celelalte două etape” se verifică ($60+720=60+720$).

Timp maxim de execuție/test: 1 secundă